

Preparazione e messa a punto



Assicurarsi che le attrezzature ed i locali siano puliti e disinfettati



Assicurarsi che le attrezzature funzionino correttamente (cappe, aspiratori, generatori, luci)



Assicurare un sufficiente livello di ventilazione per mantenere una buona qualità dell'aria



Distribuire uniformemente la lettiera (7cm ☀ - 10cm ❄)



Assicurare 2 punti mangime e 2 punti acqua per 100 pulcini, 50% dei quali possono essere manuali



Distribuire uniformemente l'attrezzatura ma non direttamente sotto la cappa



Preriscaldare i locali in maniera adeguata in relazione alla stagione



Assicurare l'assenza di correnti d'aria



Prima dell'accasamento

- Riempire gli abbeveratoi con acqua di buona qualità
- Riempire i punti mangime con del mangime sbriciolato di buona qualità

Costantemente



Una corretta ed uniforme illuminazione

- Nelle prime 24 ore i pulcini ricevono una ora di buio
- Garantire un minimo di 80 lux all'accasamento



Controllare i pulcini ogni due ore per assicurarsi sulla loro corretta disposizione




"Rinfrescare" perlomeno 3 volte al giorno i punti mangime per stimolare il consumo dei pulcini



Pulire e riempire gli abbeveratoi almeno 3 volte al giorno controllando i livelli per ridurre le fuoriuscite di acqua



Togliere e rimpiazzare la lettiera bagnata ed umida



Questo è un esempio impostato

Accasamento



Raggruppare i pulcini in relazione all'età dei riproduttori



Immettere i pulcini vicino ai punti acqua e mangime



Immettere i pulcini velocemente ed in silenzio




Lasciare che i pulcini si "abituino" al nuovo ambiente



Troppo caldo



Troppo freddo



Troppo correnti d'aria

Fattori chiave per una buona "partenza" dei vostri pulcini



Controllare i pulcini ogni 2 ore



Accessibilità dei punti mangime ed acqua

- Le mangiatoie e gli abbeveratoi manuali sono estremamente importanti
- Sono essenziali la regolare pulizia e la corretta regolazione dell'attrezzatura



Iniziare a rimuovere gradualmente l'attrezzatura manuale dopo 48 ore dall'accasamento



Rispondere velocemente ai cambi di comportamento dei pulcini con una adeguata regolazione dell'ambiente