

Preparación y configuración



Comprobar que el alojamiento y el equipo esté limpio y desinfectado




Comprobar que el equipo funcione adecuadamente: criaderos, ventiladores, generadores, luces



Asegurar ventilación suficiente para mantener una buena calidad del aire



Repartir los lechos de forma suave y uniforme (7cm ☀ - 10cm ☁)



Asegurar 2 puntos de comida y 2 de bebida por 100 aves, el 50% de ellos es equipo suplementario



Disponer el equipo adecuadamente aunque no inmediatamente por debajo del criadero y distribuir de forma uniforme



Pre calentamiento adecuado dependiendo de la estación
Temperatura en el marco perimetral 28°C -36-40°C



Asegurar que no haya corrientes de aire



Justo antes de colocarlos
- Llenar los bebederos con agua de buena calidad
- Llenar los puntos de comida con migas de buena calidad

Constante



La iluminación ha de ser buena e uniforme
- Las primeras 24 horas las aves están mínimo 1 hora en la oscuridad
- Intensidad luminica mínima de 80 lux en el lugar



Comprobar las aves cada 2 horas para garantizar que la distribución de las mismas sea correcta




Renovar los puntos de comida mínimo 3 veces al día para estimular el consumo



Limpiar y rellenar los bebederos mínimo 3 veces al día y reducir los derrames



Retirar y sustituir los lechos húmedos



Esta es una configuración de ejemplo

Colocación



Reagrupar los polluelos por edad de las reproductoras



Colocar los polluelos cerca de los puntos de comida y bebida



Colocar los polluelos de forma rápida y silenciosa




Dejar que los polluelos se adapten al nuevo entorno



Demasiado calor



Demasiado frío



Demasiada corriente de aire

Factores fundamentales para un buen comienzo



Comprobar las aves cada 2 horas



Accesibilidad de los puntos de comida y bebederos
- Los puntos de comida y los bebederos suplementarios son importantes
- Es esencial la limpieza regular y el ajuste apropiado del equipo



Retirar gradualmente el equipo suplementario después de 48 horas



Atención inmediata de cualquier cambio en el comportamiento de las aves con ajuste adecuado del entorno