

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРМЛЕНИЮ ПОРОД В.У.Т. И NICHOLAS

		Начало жизненного цикла 0 - 6 недель		Рост 7 - 29 недель		Яйцекладка - с 29 недель	
Добавленные витамины на кг	Единица	на пшеничной основе	на кукурузной основе	на пшеничной основе	на кукурузной основе	на пшеничной основе	на кукурузной основе
витамин А	МЕ	12000	11000	8000	6000	12000	11000
витамин D3	МЕ	5000	5000	4000	4000	5000	5000
витамин Е	МЕ	100	100	50	50	120	120
витамин К	мг	4	4	2	2	5	5
тиамин (витамин В1)	мг	4	4	1	1	4	4
рибофлавин (витамин В2)	мг	15	15	5	5	20	20
никотиновая кислота	мг	100	110	50	55	80	90
пантотеновая кислота	мг	28	30	15	16	28	30
пиридоксин	мг	7	6	5	4	7	6
биотин	мг	0.4	0.3	0.3	0.2	0.45	0.3
фолиевая кислота	мг	4	4	2	2	6	6
витамин В12	мг	0.04	0.04	0.02	0.02	0.04	0.04
холин	мг	1000	1200	600	800	800	1000
Добавленные микроэлементы на кг	Единица						
медь	мг	15		15		15	
железо	мг	45		40		45	
марганец	мг	120		110		120	
селен*	мг	0.4		0.3		0.4	
цинк	мг	110		80		110	
йод	мг	3		2		3	

*50% селена должно быть в органической форме.

Некоторые процессы измельчения разрушают витаминную активность, в таком случае для возмещения этих потерь необходимо добавлять больше витаминов.

Индюки-производители должны получать ту же витаминно-минеральную добавку с микроэлементами, что и несушки.

Для защиты витаминов в премикс следует добавить антиоксидант.