



MÂLES

Âge (sem)	Poids vif (kg)	Gain moyen quotidien (g/sujet/jour)	IC cumulé (kg/kg)	Consommation aliment journalière (g/sujet/jour)
1	0.18	25	0.90	23
2	0.37	27	1.22	43
3	0.72	34	1.35	73
4	1.23	44	1.42	112
5	1.93	55	1.47	156
6	2.81	67	1.52	202
7	3.84	78	1.57	250
8	5.00	89	1.62	297
9	6.26	99	1.68	342
10	7.60	109	1.73	385
11	8.99	117	1.80	424
12	10.42	124	1.86	460
13	11.87	130	1.92	494
14	13.31	136	1.99	524
15	14.75	140	2.06	551
16	16.16	144	2.13	575
17	17.55	148	2.20	596
18	18.91	150	2.27	615
19	20.23	152	2.34	630
20	21.50	154	2.41	641
21	22.72	155	2.48	650
22	23.88	155	2.55	655

FEMELLES

Âge (sem)	Poids vif (kg)	Gain moyen quotidien (g/sujet/jour)	IC cumulé (kg/kg)	Consommation aliment journalière (g/sujet/jour)
1	0.17	24	0.88	21
2	0.34	24	1.25	39
3	0.63	30	1.41	66
4	1.05	38	1.49	98
5	1.61	46	1.55	133
6	2.28	54	1.61	168
7	3.04	62	1.67	203
8	3.88	69	1.74	237
9	4.77	76	1.81	272
10	5.71	82	1.89	306
11	6.67	87	1.97	339
12	7.65	91	2.06	369
13	8.62	95	2.15	394
14	9.55	97	2.24	415
15	10.45	100	2.34	429
16	11.29	101	2.44	439
17	12.07	101	2.54	445
18	12.79	102	2.64	449

Nos standards sont basés sur des estimations de résultats pouvant être obtenus en conditions classiques d'élevage de chair. En conditions très favorables (petits lots, faible densité, ventilation optimale, bon accès à l'aliment) les résultats obtenus peuvent largement dépasser les standards.

Les objectifs s'appliquent à des conditions climatiques tempérées. Les résultats seront affectés en période estivale dans les pays à climats méditerranéens ou tropicaux. La nutrition a une influence majeure sur les performances. La base de ces standards suppose l'utilisation de régimes conformes aux recommandations d'Aviagen Turkeys (Section B.U.T.), l'utilisation de miettes ou micro granulé au démarrage puis l'utilisation d'un bon granulé par la suite.

Les performances peuvent être influencées par différents facteurs, ce document ne peut pas être considéré comme une forme de garantie.