



Cheshire Bronze

LEISTUNGSZIELE

HAHN

| Alter (Wochen) | Lebendgewicht (kg) | Durchschnittliche Zunahme pro Tag (g/Tier/Tag) | Kumulative Futtermittelnutzung (kg/kg) | Tägliche Futtermittelaufnahme (g/Tier/Tag) |
|-------------------|-----------------------|--|--|--|
| 1 | 0,17 | 23,7 | 0,92 | 22 |
| 2 | 0,36 | 25,5 | 1,25 | 42 |
| 3 | 0,66 | 31,6 | 1,39 | 68 |
| 4 | 1,11 | 39,7 | 1,46 | 100 |
| 5 | 1,72 | 49,0 | 1,52 | 140 |
| 6 | 2,48 | 59,1 | 1,57 | 185 |
| 7 | 3,40 | 69,3 | 1,62 | 232 |
| 8 | 4,44 | 79,2 | 1,68 | 278 |
| 9 | 5,57 | 88,4 | 1,74 | 321 |
| 10 | 6,76 | 96,6 | 1,81 | 357 |
| 11 | 7,98 | 103,6 | 1,87 | 388 |
| 12 | 9,20 | 109,5 | 1,94 | 413 |
| 13 | 10,42 | 114,5 | 2,00 | 436 |
| 14 | 11,63 | 118,7 | 2,07 | 459 |
| 15 | 12,84 | 122,3 | 2,14 | 485 |
| 16 | 14,07 | 125,6 | 2,21 | 511 |
| 17 | 15,29 | 128,5 | 2,28 | 537 |
| 18 | 16,52 | 131,1 | 2,34 | 559 |
| 19 | 17,72 | 133,2 | 2,41 | 576 |
| 20 | 18,88 | 134,9 | 2,48 | 586 |
| 21 | 20,00 | 136,1 | 2,55 | 591 |
| 22 | 21,06 | 136,8 | 2,62 | 591 |

HENNE

| Alter (Wochen) | Lebendgewicht (kg) | Durchschnittliche Zunahme pro Tag (g/Tier/Tag) | Kumulative Futtermittelnutzung (kg/kg) | Tägliche Futtermittelaufnahme (g/Tier/Tag) |
|-------------------|-----------------------|--|--|--|
| 1 | 0,16 | 22,6 | 0,87 | 20 |
| 2 | 0,33 | 23,3 | 1,24 | 38 |
| 3 | 0,59 | 27,9 | 1,40 | 59 |
| 4 | 0,95 | 34,0 | 1,49 | 85 |
| 5 | 1,43 | 40,8 | 1,55 | 115 |
| 6 | 2,01 | 47,8 | 1,62 | 148 |
| 7 | 2,69 | 54,8 | 1,69 | 183 |
| 8 | 3,44 | 61,4 | 1,76 | 218 |
| 9 | 4,25 | 67,4 | 1,84 | 250 |
| 10 | 5,09 | 72,7 | 1,92 | 280 |
| 11 | 5,94 | 77,1 | 2,00 | 305 |
| 12 | 6,79 | 80,8 | 2,09 | 327 |
| 13 | 7,62 | 83,7 | 2,18 | 346 |
| 14 | 8,43 | 86,0 | 2,27 | 363 |
| 15 | 9,21 | 87,7 | 2,37 | 378 |
| 16 | 9,97 | 89,0 | 2,46 | 390 |
| 17 | 10,68 | 89,8 | 2,56 | 400 |
| 18 | 11,36 | 90,2 | 2,66 | 408 |

Die angegebenen Leistungsziele sind eine Einschätzung der Resultate, die bei guten Bedingungen in den Betrieben erzielt werden können. Bei optimalen Haltungsbedingungen (z. B. Besatzdichte, Lüftung und Futterverfügbarkeit) können die erreichten Ergebnisse noch besser ausfallen als hier angegeben.

Die Ziele gelten für mitteleuropäische Kontinental- und Seeklimabedingungen. Während der Sommerzeit können geringere Leistungen in Ländern des Mittelmeerraums sowie in Ländern mit tropischem Klima möglich sein. Die Fütterung hat einen großen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit. Die Zielgrundlage ist eine Fütterung nach den von Aviagen® Turkeys (Shire Range) empfohlenen Richtwerten sowie der Einsatz von qualitativ hochwertigem Granulat, Minipellets und Pellets.

Die Leistung kann durch verschiedene, bereits in den jeweiligen Betrieben vorhandene Faktoren beeinträchtigt werden. Daher können und sollen diese Ziele (bzw. Hinweise) nicht als Garantie angesehen werden. Aviagen Turkeys Limited übernimmt keine Haftung für die Nutzung dieser Informationen.